



एकाइ ७ • चाल र बल: पिण्ड, तौल र स्वतन्त्र खसाइ

नाम _____ कक्षा _____ रोल नं. _____ मिति _____ प्राप्ताङ्क _____ / ३३

1 मुख्य शब्द

[4]

कोठामा दिइएका उपयुक्त शब्द छानी तलको अनुच्छेदका खाली ठाउँ भर्नुहोस्। कोठाका दुईओटा शब्द प्रयोग हुँदैनन्। प्रत्येक खाली ठाउँको ०.५ अङ्क छ।



ऊर्ध्वचाप जडत्व टर्मिनल भेलोसिटी तौल तौल विहीनता न्युटन पिण्ड भौतिक तराजु स्प्रिङ तराजु स्वतन्त्र खसाइ

वस्तुमा भएको जम्मा पदार्थको मात्रालाई त्यस वस्तुको _____ भनिन्छ। यसलाई _____ ले नापिन्छ। कुनै वस्तुमा लाग्ने गुरुत्वबल नै त्यस वस्तुको _____ हो। यसको SI एकाइ _____ हो र यसलाई _____ ले नापिन्छ। अरू कुनै बल नलागी केवल गुरुत्वबलको प्रभावमा हुने वस्तुको खसाइलाई _____ भनिन्छ। हावाको अवरोध तौलसँग बराबर भएपछि प्यारासुट स्थिर वेगले खस्छ। यस स्थिर वेगलाई _____ भनिन्छ। स्वतन्त्र खसाइमा वस्तुले कुनै वस्तुलाई नथिच्ने र नतान्ने अवस्थालाई _____ भनिन्छ।

2 चित्रको नामाङ्कन

[3]

चित्रमा क्रियाकलाप ७.७ देखाइएको छ: स्प्रिङ तराजुमा झुन्ड्याइएको फ्रेमभित्र धागोले बाँधिएको ढुङ्गा, पहिले समातिएको (बायाँ) र त्यसपछि स्वतन्त्र रूपले खस्दै (दायाँ)। १ देखि ६ सम्मका अङ्कले जनाएका ठाउँमा भागको नाम वा अवलोकन लेख्नुहोस्। प्रत्येकको ०.५ अङ्क छ।



1. _____
3. _____
5. _____

2. _____
4. _____
6. _____



[5]

तलका प्रश्नको सही विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

- i. तलका मध्ये कुन स्थानमा तपाईँको तौल मापन गर्दा सबैभन्दा बढी तौल हुन्छ? [1]

क. सगरमाथाको चुचुरो	ख. अपी हिमालको चुचुरो
ग. झापाको केचनाकवल	घ. चन्द्रागिरि पहाड

 - ii. 70 kg पिण्ड भएका एक जना अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीबाट चन्द्रमा जान्छन्। चन्द्रमामा उनको पिण्ड र तौल कति हुन्छ? [1]

क. पिण्ड र तौल दुवै 6 गुणा कम हुन्छ	
ख. पिण्ड 6 गुणा कम हुन्छ, तौल उही रहन्छ	
ग. पिण्ड 70 kg नै रहन्छ, तौल करिब 6 गुणा कम हुन्छ	
घ. पिण्ड र तौल दुवै उही रहन्छन्	

 - iii. पृथ्वीमा 750 N तौल भएको मानिसको चन्द्रमामा हुने तौल कति हुन्छ? (चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग = 1.63 m/s^2 , पृथ्वीको 9.8 m/s^2) [1]

क. 124.74 N	ख. 125 N
ग. 126.8 N	घ. 127.8 N

 - iv. स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुलाई प्रत्येक सेकेन्डमा अवलोकन गर्दा तलका मध्ये कुन निष्कर्ष सही हुन्छ? [1]

क. दूरी समान रूपले बढ्छ।	ख. गति समान रूपले बढ्छ।
ग. प्रवेग समान रूपले बढ्छ।	घ. स्थानान्तरण समान रूपले बढ्छ।

 - v. एउटी केटी लिफ्टभिन्न बाथरूमको तराजुमा उभिएकी छिन्। लिफ्टको तार चुँडिन्छ र लिफ्ट स्वतन्त्र रूपले खस्न थाल्छ। खस्दै गर्दा तराजुमा कति देखिन्छ? [1]

क. उनको सामान्य तौल	ख. सामान्य तौलभन्दा बढी
ग. शून्य	घ. तौल होइन, किलोग्राममा उनको पिण्ड

[3]

तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क.** तौल विहीनता भनेको के हो? [1]

ख. कस्तो अवस्थामा वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र हुन्छ? [1]

ग. अन्तिम गति v , सुरुको गति u , गुरुत्व प्रवेग g र उचाइ h बिचको सम्बन्ध देखाउने चालसम्बन्धी समीकरण लेख्नुहोस्। [1]



[6]

तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

क. पिण्ड र तौलबिच कुनै दुई फरक लेख्नुहोस्।

[2]

ख. कारण लेख्नुहोस्: धेरै उचाइबाट हाम फाल्दा चोटपटक लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

[2]

ग. कारण लेख्नुहोस्: एउटा कापीका दुईओटा पानामध्ये एउटालाई डल्लो पारेर र अर्कोलाई त्यत्तिकै हावामा एकसाथ खसाल्दा डल्लो पारेको कागज छिटो खस्छ।

[2]

[4]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

प्यारासुट प्रयोग गरी हवाईजहाजबाट पृथ्वीमा हाम फाल्दा सुरक्षित अवतरण कसरी सम्भव हुन्छ? के चन्द्रमाको सतहमा पनि प्यारासुटबाट सुरक्षित अवतरण सम्भव हुन्छ? कारणसहित उल्लेख गर्नुहोस्।

[6]

तलका गणितीय समस्या समाधान गर्नुहोस्। हिसाबका सबै चरण देखाउनुहोस्। (पृथ्वीमा $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

क. मङ्गल ग्रहमा गुरुत्व प्रवेग 3.75 m/s^2 हुन्छ। पृथ्वीमा 100 kg पिण्ड उचाल्न सक्ने भारत्तोलकले मङ्गल ग्रहमा कति पिण्ड उचाल्न सक्छन्?

[2]

[illegible]

उत्तर:



ख. एउटा ढुङ्गालाई 15 m को उचाइबाट खसाल्दा ढुङ्गालाई जमिनमा पुग्न कति समय लाग्छ? ढुङ्गा जमिनमा ठोक्कँदाको गति हिसाब गर्नुहोस्।

[4]

[illegible]

उत्तर:

8 सोचूहोस्

[2]

सोचेर उत्तर लेख्नुहोस्।

एक जना विद्यार्थीले पहाडी भेकमा भौतिक तराजुमा जोखेर सुन्तला किन्ने र तराईमा ल्याएर प्रतिकिलोग्राम उही मूल्यमा बेच्दा फाइदा हुने युक्ति बताए। उनको युक्ति वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा सही छ कि छैन, पृष्ठि गर्नुहोस्।

9 क्रियाकलाप: रूलरले आप्नो प्रतिक्रिया समय नापुहोस्

(अङ्क नदिइने)

साथीलाई 30 cm को रूलर ठाडो झुन्डिने गरी समान्त लगाउनुहोस्। रूलरको शून्य भएको छेउ तपाईंको खुला औंला र बुढीऔंलाको बिचमा पर्नुपर्छ। साथीले कुनै सङ्केत नदिई रूलर छोड्छन् र तपाईं सकेसम्म छिटो समान्तुहुन्छ। रूलर खसेको दुरी h नाप्नुहोस् र $t = \sqrt{2h/g}$ बाट प्रतिक्रिया समय निकाल्नुहोस्। h मिटरमा राख्नुहोस्।

प्रयास	खसेको दुरी, h (m)	प्रतिक्रिया समय, $t = \sqrt{(2h/g)}$ (s)
1		
2		
3		
औसत		

रुलर समाप्ति यो क्रियाकलाप स्वतन्त्र खसाइको प्रयोग किन हो?

