



अङ्क विभाजनमा दिइएका बुँदाका आधारमा अङ्क दिनुहोस्। फरक शब्दमा लेखिएको भए पनि उही कुरा भनेको उत्तर सही मानिन्छ।

१ मुख्य शब्द

1. प्राङ्गारिक यौगिक
2. हाइड्रोकार्बन
3. सन्तुप्त
4. प्याराफिन
5. असन्तुप्त
6. होमोलोगस शृङ्खला
7. फड्सनल गुप
8. हाइड्रोजिनेसन

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

ज्ञान • ४

२ चित्रको नामाङ्कन

1. मिथानोल मिथाइल अल्कोहल, CH_3OH • मोनोहाइड्रिक
2. ethane-1,2-diol ग्लाइकोल, $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ • डाइहाइड्रिक
3. इथानोल इथाइल अल्कोहल, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ • मोनोहाइड्रिक
4. propane-1,2,3-triol ग्लिसेरोल, $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ • ट्राइहाइड्रिक

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

ज्ञान • २

३ बहुवैकल्पिक प्रश्न

i. क. मिथेन

मिथेन (CH_4) मा एकल बन्ड मात्र हुन्छन्। इथिन अल्किन हो भने एसिटिलिन (इथाइन) र प्रोपाइन अल्काइन हुन्।

ज्ञान • १

ii. घ. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$

ग्लिसेरोल भनेको तीनओटा H को सट्टा तीनओटा OH भएको प्रोपेन (C_3H_8) हो: $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ । अरू विकल्पमा कि तीनओटा OH छैनन्, कि कार्बनका चारओटा बन्ड मिल्दैनन्।

ज्ञान • १

iii. ग. प्रोपेन

ग्लिसेरोल (propane-1,2,3-triol) तीनओटा -OH समूह भएको प्रोपेन हो। (ग्लुकोज त हाइड्रोकार्बन नै होइन।)

बोध • १

iv. ग. क्याल्सियम कार्बोनेट, CaCO_3

कार्बोनेट (चुनढुङ्गा र मार्बलजस्ता), कार्बनडाइअक्साइड, कार्बनमनोअक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट र कार्बाइडलाई अप्राङ्गारिक मानिन्छ। युरिया भने अप्राङ्गारिक यौगिकबाट बनाइएको पहिलो प्राङ्गारिक यौगिक हो।

बोध • १

v. ग. अल्काइन

$n = 6$ हुँदा अल्केनको सूत्र C_6H_{14} ($2n + 2$), अल्किनको C_6H_{12} ($2n$) र अल्काइनको C_6H_{10} ($2n - 2$) हुन्छ। यसैले यो अल्काइन हो: हेक्साइन।

प्रयोग • १

४ अति छोटो उत्तर

क. अङ्क विभाजन

✓ $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ लेखेमा।

ज्ञान • १

ख. अङ्क विभाजन

✓ मिथेन (CH_4) लेखेमा।

ज्ञान • १



- ग. अङ्क विभाजन
✓ प्रोपिन (propene) लेखेमा।

प्रयोग • 1

5 छोटो उत्तर

- क. अङ्क विभाजन

बोध • 2

- ✓ इथेनमा दुईओटा कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बन्डले जोडिएका हुन्छन् भनी लेखेमा।
- ✓ हरेक कार्बनका बाँकी सबै बन्डमा हाइड्रोजन जोडिसकेकाले थप परमाणु जोडिन सक्दैनन् भनी लेखेमा।

- ख. अङ्क विभाजन

बोध • 2

- ✓ ग्लिसरोलको अणु, $C_3H_5(OH)_3$ मा हरेक कार्बनमा एउटा गरी तीनओटा हाइड्रोक्सिल ($-OH$) समूह हुन्छन् भनी लेखेमा।
- ✓ तीनओटा $-OH$ समूह भएको अल्कोहललाई ट्राइहाइड्रिक भनिन्छ भनी लेखेमा।

- ग. अङ्क विभाजन

बोध • 2

- ✓ कुनै एउटा फरक, जस्तै: मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको हरेक अणुमा एउटा $-OH$ समूह हुन्छ; डाइहाइड्रिकमा दुईओटा हुन्छन्, लेखेमा।
- ✓ अर्को कुनै फरक, जस्तै: सामान्य सूत्र $C_nH_{2n+1}OH$ र $C_nH_{2n}(OH)_2$, वा उदाहरण इथानोल (C_2H_5OH) र ग्लाइकोल ($C_2H_4(OH)_2$), लेखेमा।

- घ. अङ्क विभाजन

ज्ञान • 2

- ✓ i. मिथाइल अल्कोहल (मिथानोल) र (ii) इथाइल अल्कोहल (इथानोल) लेखेमा।
- ✓ iii. इथाइल अल्कोहल र (iv) इथाइल अल्कोहल (इथानोल) लेखेमा।

6 लामो उत्तर

- क. उत्तर

बोध • 4

अल्केनका एक वा एकभन्दा बढी हाइड्रोजन परमाणुलाई हाइड्रोक्सिल ($-OH$) समूहले प्रतिस्थापन गर्दा बन्ने प्राङ्गारिक यौगिकलाई अल्कोहल भनिन्छ। यसको फङ्सनल ग्रुप $-OH$ हो।

- मोनोहाइड्रिक (एउटा $-OH$): मिथानोल, CH_3OH ; इथानोल, C_2H_5OH ।
- डाइहाइड्रिक (दुईओटा $-OH$): ग्लाइकोल (ethane-1,2-diol), $C_2H_4(OH)_2$ ।
- ट्राइहाइड्रिक (तीनओटा $-OH$): ग्लिसरोल (propane-1,2,3-triol), $C_3H_5(OH)_3$ ।

संरचनात्मक सूत्र पुस्तकको चित्रमा जस्तै कोर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, इथानोलको संरचनात्मक सूत्र हरेक बन्ड कोरिएको H_3C-CH_2-OH हो: लहरमा दुईओटा कार्बन, पहिलोमा तीनओटा H, दोस्रोमा दुईओटा H र अन्त्यमा $-OH$ ।

अङ्क विभाजन

- ✓ अल्केनका एक वा बढी H परमाणुलाई $-OH$ (हाइड्रोक्सिल) समूहले प्रतिस्थापन गर्दा बन्ने यौगिक अल्कोहल हो भनी लेखेमा।
- ✓ मोनोहाइड्रिक (एउटा $-OH$), जस्तै मिथानोल CH_3OH वा इथानोल C_2H_5OH लेखेमा।
- ✓ डाइहाइड्रिक (दुईओटा $-OH$), जस्तै ग्लाइकोल $C_2H_4(OH)_2$ र ट्राइहाइड्रिक (तीनओटा $-OH$), जस्तै ग्लिसरोल $C_3H_5(OH)_3$ लेखेमा।
- ✓ हरेक प्रकारको एउटा अल्कोहल (वा दिइएका उदाहरण) को सही संरचनात्मक सूत्र कोरेमा।



ग्लिसरोल (ग्लिसिरिन), $C_3H_5(OH)_3$ । IUPAC नाम: **propane-1,2,3-triol**। संरचनात्मक सूत्रमा लहरमा रहेका तीनओटा कार्बनमा एउटा एउटा $-OH$ हुन्छ (पुस्तकको चित्रमा जस्तै)।

उपयोगिता:

1. छालालाई ओसिलो राख्न क्रिम र लोसनमा;
2. राम्रो गुणस्तरका साबुन, कस्मेटिक र सेभिङ क्रिममा;
3. खानेकुरा गुलियो बनाउन र सुकेका फलफूल तथा सुर्तीलाई रसिलो राख्न।

अङ्क विभाजन

- ✓ ग्लिसरोल (ग्लिसिरिन), $C_3H_5(OH)_3$ लेखेमा।
- ✓ IUPAC नाम: **propane-1,2,3-triol** लेखेमा।
- ✓ संरचनात्मक सूत्र: लहरमा तीनओटा कार्बन, हरेकमा एउटा $-OH$, हरेक C का चारओटा बन्ड कोरेमा।
- ✓ तीनओटा उपयोगिता, जस्तै: छालाको क्रिम (छाला ओसिलो राख्न), साबुन र सौन्दर्य सामग्री, खानेकुरामा गुलियो पदार्थका रूपमा, लेखेमा।

7 गणितीय समस्या

C_nH_{2n+2} मा $n = 7$ राख्दा $H = 2 \times 7 + 2 = 16$, त्यसैले सूत्र C_7H_{16} (हेप्टेन) हो। आणविक भार $= 7 \times 12 + 16 \times 1 = 84 + 16 = 100$

अङ्क विभाजन

- ✓ C_nH_{2n+2} बाट C_7H_{16} लेखेमा।
- ✓ आणविक भार $= 7 \times 12 + 16 \times 1 = 100$ निकालेमा।

अल्किनको सूत्र C_nH_{2n} हुने भएकाले यसको भार $12n + 2n = 14n$ हुन्छ। $14n = 56$, त्यसैले $n = 4$: C_4H_8 , ब्युटिन। (जाँच: $4 \times 12 + 8 = 56$)

अङ्क विभाजन

- ✓ C_nH_{2n} को भार $= 14n = 56$, त्यसैले $n = 4$ निकालेमा।
- ✓ C_4H_8 , ब्युटिन लेखेमा।

8 सोचुहोस्

तेललाई हाइड्रोजन ग्यास र निकल उत्प्रेरकसँग तताइन्छ: यसलाई हाइड्रोजिनेसन भनिन्छ। तरल तेलमा असन्तृप्त प्याटी अम्ल हुन्छन्, जसका $C=C$ डबल बन्डका कारण अणु बाङ्गिएका हुन्छन् र एकअर्कासँग खाँदिएर बस्न सक्दैनन्। डबल बन्डमा हाइड्रोजन थपिएपछि ती सन्तृप्त, सिधा अणु बन्छन् र खाँदिएर बस्छन्; त्यसैले बोसो ठोस हुन्छ।

अङ्क विभाजन

- ✓ हाइड्रोजिनेसन: तेललाई हाइड्रोजन र निकल उत्प्रेरकसँग तताउँदा यसका $C=C$ डबल बन्डमा हाइड्रोजन थपिन्छ भनी लेखेमा।
- ✓ असन्तृप्त (बाङ्गिएका) प्याटी अम्ल सन्तृप्त (सिधा) बन्छन् र खाँदिएर बसी ठोस बोसो बन्छ भनी लेखेमा।



9 क्रियाकलाप: हाइड्रोकार्बनका नमुना

(अङ्क नदिइने)

विद्यार्थीले पाउनुपर्ने नतिजा

मिथेन: 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, C-C बन्ड छैन; हाइड्रोजन टेट्राहेड्रनका कुनातिर फर्केका हुन्छन् (त्रिआयामिक)। इथेन: 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एकल बन्ड; त्रिआयामिक। इथिन: 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, डबल बन्ड; समतल। इथाइन: 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, ट्रिपल बन्ड; सिधा रेखा। जुनसुकै अणुमा पनि हरेक कार्बनमा चारओटै टुथपिक हुन्छन्, त्यसैले कार्बनबिच एउटा बन्ड थपिएपिच्छे दुईओटा हाइड्रोजन कम अटाउँछन्।

तहअनुसार अङ्क	ज्ञान	बोध	प्रयोग	उच्च दक्षता	जम्मा
अङ्क	12	12	10	2	36

