



अङ्क विभाजनमा दिइएका बुँदाका आधारमा अङ्क दिनुहोस्। फरक शब्दमा लेखिएको भए पनि उही कुरा भनेको उत्तर सही मानिन्छ।

१ मुख्य शब्द

१. पदार्थ
२. न्युक्लियस
३. न्युट्रोन
४. पारमाणविक सङ्ख्या
५. सेल
६. संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन
७. संयुज्यता
८. आणविक सूत्र

ज्ञान • ४

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

२ चित्रको नामाङ्कन

१. न्युक्लियस
२. K सेल, $n = 1$ इनर्जी लेभल १: बढीमा $2 \times 1^2 = 2$ इलेक्ट्रोन
३. L सेल, $n = 2$ इनर्जी लेभल २: बढीमा $2 \times 2^2 = 8$ इलेक्ट्रोन
४. M सेल, $n = 3$ इनर्जी लेभल ३: बढीमा $2 \times 3^2 = 18$ इलेक्ट्रोन
५. N सेल, $n = 4$ इनर्जी लेभल ४: बढीमा $2 \times 4^2 = 32$ इलेक्ट्रोन
६. न्युक्लियसबाट टाढा जाँदा ऊर्जा बढ्छ

प्रयोग • ३

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

३ बहुवैकल्पिक प्रश्न

i. ग. न्युट्रोन र प्रोटोन

ज्ञान • १

न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छन्। इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि सेलहरूमा घुम्छन्।

ii. ग. नियोन

ज्ञान • १

नियोन (२, ८) को बाहिरी सेल पहिल्यै भरिएको हुन्छ। त्यसैले यसले इलेक्ट्रोन दिँदैन, लिँदैन र साझेदारी पनि गर्दैन। हाइड्रोजन र सोडियमको संयुज्यता १ र क्याल्सियमको २ हुन्छ।

iii. ख. २, ८, ६

बोध • १

भित्रबाट भर्दा K सेलमा २, L सेलमा ८ र बाँकी ६ ओटा M सेलमा पर्छन्: २, ८, ६। “२, १४” मा L सेलमा ८ ओटा मात्र अटाउँछन् भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। “२, ६, ८” मा गलत क्रमले भरिएको छ।

iv. क. CaO

प्रयोग • १

क्याल्सियम र अक्सिजन दुवैको संयुज्यता २ हुन्छ। साटासाट गर्दा Ca_2O_2 हुन्छ र २ ले भाग गर्दा CaO हुन्छ। CaCO_3 चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट (चुनढुङ्गा) हो।

v. घ. आर्गन

प्रयोग • १

प्रोटोन र न्युट्रोन जोडदा पोटासियमको $19 + 20 = 39$, कार्बनको १२, अक्सिजनको १६ र आर्गनको $18 + 22 = 40$ हुन्छ। पोटासियमको पारमाणविक सङ्ख्या ठुलो भए पनि आर्गन पोटासियमभन्दा गह्रौँ हुन्छ।

४ अति छोटो उत्तर

क. अङ्क विभाजन

ज्ञान • १

✓ संयुज्यता सूचक सेल लेखेमा।



- ख. अङ्क विभाजन प्रयोग - 1
✓ 18 ओटा (2×3^2) निकालेमा।
- ग. अङ्क विभाजन प्रयोग - 1
✓ 23 amu निकालेमा।

5 छोटो उत्तर

- क. अङ्क विभाजन बोध - 2
✓ कुनै एउटा फरक, जस्तै: प्रोटोन धनात्मक चार्जयुक्त (p^+) हुन्छ; इलेक्ट्रोन ऋणात्मक चार्जयुक्त (e^-) हुन्छ, लेखेमा।
✓ अर्को कुनै फरक, जस्तै: प्रोटोन न्युक्लियसमा हुन्छ र यसको पिण्ड 1 amu हुन्छ; इलेक्ट्रोन सेलमा घुम्छ र यसको पिण्ड करिब $1/1836$ amu हुन्छ, लेखेमा।
- ख. अङ्क विभाजन बोध - 2
✓ परमाणुमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ र न्युट्रोनमा चार्ज हुँदैन भनी लेखेमा।
✓ हरेक प्रोटोनको धनात्मक चार्ज र हरेक इलेक्ट्रोनको ऋणात्मक चार्ज बराबर हुने भएकाले ती सन्तुलित हुन्छन् भनी लेखेमा।
- ग. अङ्क विभाजन प्रयोग - 2
✓ संयुज्यता 1 लेखेमा।
✓ यसमा 1 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छ र त्यो दिँदा बाहिरी सेलमा 8 (2, 8, 8) पुग्छ; 7 इलेक्ट्रोन लिनुभन्दा यो सजिलो हुन्छ भनी लेखेमा।

6 लामो उत्तर

- क. उत्तर प्रयोग - 4
i. उनले 6 प्रोटोन कोरेकी छन्, तर सोडियममा 11 प्रोटोन हुन्छन् (पारमाणविक सङ्ख्या 11)। उनले 8 न्युट्रोन कोरेकी छन्, तर सोडियममा 12 न्युट्रोन हुन्छन् ($11 + 12 = 23$ amu)। उनले 10 इलेक्ट्रोन कोरेकी छन्, तर सोडियममा 11 इलेक्ट्रोन हुन्छन्।
ii. 2, 8, 1: M सेलमा कुनै इलेक्ट्रोन जानुअघि L सेलमा 8 इलेक्ट्रोन पुगिसक्नुपर्छ (उनले 2, 7, 1 कोरेकी छन्)।
- अङ्क विभाजन
✓ पहिलो गल्ती: 6 प्रोटोन कोरिएको, सोडियममा 11 हुन्छन् भनी लेखेमा।
✓ दोस्रो गल्ती: 8 न्युट्रोन कोरिएको, सोडियममा 12 हुन्छन् भनी लेखेमा।
✓ तेस्रो गल्ती: 10 इलेक्ट्रोन कोरिएको, सोडियममा 11 हुन्छन् भनी लेखेमा।
✓ सही इलेक्ट्रोन विन्यास 2, 8, 1 लेखेमा (M सेलमा जानुअघि L सेलमा 8 पुग्छन्)।
- ख. उत्तर बोध - 4
प्रोटोनको सङ्ख्या, अर्थात् पारमाणविक सङ्ख्या 19 भएकाले यो तत्व पोट्यासियम (K) हो। चित्र कोर्दा न्युक्लियसमा $19p^+$ र $20n^0$ लेखेर K सेलमा 2, L मा 8, M मा 8 र N मा 1 इलेक्ट्रोन देखाइन्छ। पारमाणविक भार निकाल्न प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिन्छ, किनकि परमाणुको लगभग सबै पिण्ड न्युक्लियसमा हुन्छ; इलेक्ट्रोन अति हलुका (करिब $1/1836$ amu) हुने भएकाले गनिँदैनन्। यहाँ $19 + 20 = 39$ amu हुन्छ।
- अङ्क विभाजन
✓ 19 प्रोटोन, अर्थात् पारमाणविक सङ्ख्या 19 भएकाले पोट्यासियम (K) लेखेमा।
✓ न्युक्लियस ($19p^+$, $20n^0$) र चार सेलमा 2, 8, 8, 1 गरी 19 इलेक्ट्रोन कोरेमा।
✓ प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिन्छ भनी लेखेमा।
✓ कारण: लगभग सबै पिण्ड न्युक्लियसमा हुन्छ (इलेक्ट्रोन करिब $1/1836$ amu, गन्न नपर्ने गरी हलुका); $19 + 20 = 39$ amu भनी लेखेमा।



7 गणितीय समस्या

उत्तर

प्रयोग - 2

H: 2 परमाणु, $2 \times 1 = 2$; S: 1 परमाणु, 32; O: 4 परमाणु, $4 \times 16 = 64$; जम्मा 7 परमाणु। आणविक भार = $2 + 32 + 64 = 98 \text{ amu}$

अङ्क विभाजन

- ✓ परमाणु गनेमा: 2 H, 1 S, 4 O (जम्मा 7)।
- ✓ आणविक भार = $2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 98 \text{ amu}$ निकालेमा।

8 सोचुहोस्

उत्तर

उच्च दक्षता - 2

तटस्थ परमाणुका रूपमा रहन सक्दैन। तटस्थ हुन परमाणुमा जति प्रोटोन छन्, त्यति नै इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। परमाणुका सबै इलेक्ट्रोन हटाइएमा धनात्मक चार्जयुक्त न्युक्लियस मात्र बाँकी रहन्छ। यो परमाणु नभई आयोन हो। यसको व्यवहार पूरै फरक हुन्छ र यसले नजिकको जुनसुकै कुराबाट तुरुन्तै इलेक्ट्रोन खोसिहाल्छ। (एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएको हाइड्रोजन परमाणु प्रोटोन मात्र, अर्थात् H^+ हुन्छ।) यसका साथै रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुलाई अरू परमाणुसँग जोड्ने पनि इलेक्ट्रोन नै हुन्।

अङ्क विभाजन

- ✓ रहन सक्दैन: तटस्थ परमाणुमा प्रोटोनजति नै इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ; सबै इलेक्ट्रोन हटाउँदा धनात्मक चार्जयुक्त न्युक्लियस, अर्थात् आयोन मात्र बाँकी रहन्छ भनी लेखेमा।
- ✓ रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुलाई अरू परमाणुसँग जोड्ने इलेक्ट्रोन नै हुन् (इलेक्ट्रोनविनाको न्युक्लियसले नजिकबाट तुरुन्तै इलेक्ट्रोन खोस्छ) भनी लेखेमा।

9 क्रियाकलाप: सेल र संयुज्यता

(अङ्क नदिइने)

विद्यार्थीले पाउनुपर्ने नतिजा

लिथियम 2, 1: 1 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन, संयुज्यता 1 (दिन्छ)। नाइट्रोजन 2, 5: 5, संयुज्यता 3 (लिन्छ)। नियोन 2, 8: 8, संयुज्यता 0 (न दिन्छ न लिन्छ)। म्याग्नेसियम 2, 8, 2: 2, संयुज्यता 2 (दिन्छ)। सल्फर 2, 8, 6: 6, संयुज्यता 2 (लिन्छ)। क्याल्सियम 2, 8, 8, 2: 2, संयुज्यता 2 (दिन्छ)। 1-3 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन भएका परमाणुले तिनलाई दिन्छन् भने 5-7 भएकाले 8 पुऱ्याउन इलेक्ट्रोन लिन्छन्।

तहअनुसार अङ्क	ज्ञान	बोध	प्रयोग	उच्च दक्षता	जम्मा
अङ्क	7	9	15	2	33





अङ्क विभाजनमा दिइएका बुँदाका आधारमा अङ्क दिनुहोस्। फरक शब्दमा लेखिएको भए पनि उही कुरा भनेको उत्तर सही मानिन्छ।

१ मुख्य शब्द

१. पारमाणविक सङ्ख्या
२. ग्रुप
३. पिरियड
४. अल्काली धातु
५. हेलोजन
६. निष्क्रिय ग्याँस
७. प्रतिक्रियारत पदार्थ
८. असन्तुलित समीकरण

ज्ञान • ४

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

२ चित्रको नामाङ्कन

- | | |
|------------|------------|
| १. २, ८, १ | ५. २, ८, ५ |
| २. २, ८, २ | ६. २, ८, ६ |
| ३. २, ८, ३ | ७. २, ८, ७ |
| ४. २, ८, ४ | ८. २, ८, ८ |

बोध • ४

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

३ बहुवैकल्पिक प्रश्न

i. ख. हेनरी मोज्ले

ज्ञान • १

मोज्लेले सन् १९१३ मा पारमाणविक सङ्ख्या पत्ता लगाए र आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वलाई पारमाणविक सङ्ख्याअनुसार नै मिलाइएको छ। मेन्डेलिभले यसभन्दा पहिले पारमाणविक भारअनुसार मिलाइएको तालिका बनाएका थिए।

ii. घ. पारमाणविक सङ्ख्या

ज्ञान • १

आधुनिक पेरियोडिक नियमअनुसार तत्त्वलाई **पारमाणविक सङ्ख्याका** आधारमा मिलाइन्छ। यहाँ पारमाणविक भार र पारमाणविक पिण्डको अर्थ एउटै हो। मेन्डेलिभको पुरानो तालिका यसैमा आधारित थियो।

iii. ग. एउटै ग्रुपमा रहेका तत्त्वको संयुज्यता समान हुन्छ

बोध • १

ग्रुपका तत्त्वमा संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या समान हुने भएकाले तिनको **संयुज्यता समान** हुन्छ। अरू तीनओटा भनाइ उल्टा छन्: ग्रुपमा गुण समान हुन्छन्, तल जाँदा आकार बढ्छ र अधातुको गुण घट्छ।

iv. ख. दुवै एउटै पिरियडमा पर्छन्

बोध • १

क्लोरिन (२, ८, ७) र आर्गन (२, ८, ८) दुवैमा **३ ओटा सेल** हुने भएकाले दुवै **पिरियड ३** मा पर्छन्। क्लोरिन ग्रुप १७ को अति क्रियाशील हेलोजन हो भने आर्गन ग्रुप १८ को निष्क्रिय ग्याँस।

v. ग. ग्रुप १७, अति क्रियाशील अधातु (हेलोजन)

प्रयोग • १

यसमा ७ संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छन्, त्यसैले स्थिर हुन यसले १ इलेक्ट्रोन लिन्छ। यो **ग्रुप १७** को अति क्रियाशील अधातु हो। (यो क्लोरिन हो।) ७ संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन भएका तत्त्व ग्रुप ७ मा होइन, ग्रुप १७ मा पर्छन्। आधुनिक तालिकामा बिचका ग्रुप ३ देखि १२ सम्म सङ्क्रमण धातु हुन्छन्।



4 अति छोटो उत्तर

- क. अङ्क विभाजन ज्ञान • 1
✓ 18 ओटा ग्रुप र 7 ओटा पिरियड लेखेमा।
- ख. अङ्क विभाजन ज्ञान • 1
✓ पारो लेखेमा।
- ग. अङ्क विभाजन प्रयोग • 1
✓ पिरियड 4 (यसमा 4 ओटा सेल छन्) लेखेमा।

5 छोटो उत्तर

- क. अङ्क विभाजन बोध • 2
✓ कुनै एउटा फरक, जस्तै: ग्रुप पेरियोडिक तालिकाको ठाडो महल हो; पिरियड तेर्सो लहर हो (18 ग्रुप, 7 पिरियड), लेखेमा।
✓ अर्को कुनै फरक, जस्तै: ग्रुपका तत्त्वमा संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या समान र गुण समान हुन्छन्; पिरियडका तत्त्वमा सेलको सङ्ख्या समान हुन्छ र गुण क्रमशः बदलिन्छन्, लेखेमा।
- ख. अङ्क विभाजन बोध • 2
✓ सोडियम (2, 8, 1) मा 1 र क्लोरिन (2, 8, 7) मा 7 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुने भएकाले यी फरक ग्रुप (1 र 17) मा पर्छन् भनी लेखेमा।
✓ सोडियमले 1 इलेक्ट्रोन दिएर र क्लोरिनले 1 इलेक्ट्रोन लिएर स्थिर हुने भएकाले दुवैको संयुज्यता 1 हुन्छ भनी लेखेमा।
- ग. अङ्क विभाजन बोध • 2
✓ ग्रुपमा माथिबाट तल जाँदा धातुको गुण बढ्दै जान्छ भनी लेखेमा।
✓ हरेक तत्त्वमा एउटा सेल बढी हुने भएकाले संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन न्युक्लियसबाट टाढा र खुकुलो गरी समातिएका हुन्छन्, त्यसैले सजिलै गुमाइन्छन् भनी लेखेमा।
- घ. अङ्क विभाजन प्रयोग • 2
✓ उत्पादित पदार्थ जिङ्क सल्फेट ($ZnSO_4$) र हाइड्रोजन (H_2) लेखेमा।
✓ $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$ (दुवैतिर 1 Zn, 2 H, 1 S, 4 O, सन्तुलित) लेखेमा।

6 लामो उत्तर

- क. उत्तर बोध • 4
यो ग्रुप 2 हो; यसका तत्त्वलाई अल्कलाइन अर्थ धातु भनिन्छ। क. हरेकमा 2 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छन् (Be 2, 2; Mg 2, 8, 2; Ca 2, 8, 8, 2), त्यसैले हरेकको संयुज्यता 2 हुन्छ। ख. यी धातु हुन्: प्रतिक्रियामा 2 ओटा इलेक्ट्रोन दिन्छन्। ग. Be बाट Ca तिर जाँदा हरेक चरणमा एउटा सेल थपिने भएकाले पारमाणविक आकार बढ्छ। घ. तल जाँदा धातुको गुण र क्रियाशीलता बढ्छ। ङ. यिनका रासायनिक गुण समान हुन्छन्: हरेकले MO जस्तो अक्साइड (BeO, MgO, CaO) बनाउँछ।
- अङ्क विभाजन
✓ कुनै एउटा विशेषता, जस्तै: हरेकमा 2 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन, त्यसैले संयुज्यता 2, लेखेमा।
✓ अर्को कुनै विशेषता, जस्तै: यी 2 इलेक्ट्रोन दिने धातु हुन्, लेखेमा।
✓ तेस्रो कुनै विशेषता, जस्तै: Be बाट Ca तिर पारमाणविक आकार बढ्छ (हरेक चरणमा एउटा सेल थपिन्छ), लेखेमा।
✓ चौथो कुनै विशेषता, जस्तै: तल जाँदा धातुको गुण र क्रियाशीलता बढ्छ, वा रासायनिक गुण समान (BeO, MgO, CaO), लेखेमा।



- $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $2\text{K} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl}$
- $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$
- $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

अङ्क विभाजन

- ✓ i. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ लेखेमा (सही सूत्र $\frac{1}{2}$, सन्तुलन $\frac{1}{2}$)।
- ✓ ii. $2\text{K} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl}$ लेखेमा (सही सूत्र $\frac{1}{2}$, सन्तुलन $\frac{1}{2}$)।
- ✓ iii. $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$ लेखेमा (सही सूत्र $\frac{1}{2}$, सन्तुलन $\frac{1}{2}$)।
- ✓ iv. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ लेखेमा (सही सूत्र $\frac{1}{2}$, सन्तुलन $\frac{1}{2}$)।

7 समीकरण सन्तुलन

उत्तर

प्रयोग - 2

$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ । जाँच: N 2 = 2; H 6 = 6 (बायाँ 3 × 2, दायाँ 2 × 3)।

अङ्क विभाजन

- ✓ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ लेखेमा।
- ✓ दुवैतिर परमाणु गनेर देखाएमा: N 2 र 2, H 6 र 6।

8 सोच्नुहोस्

उत्तर

उच्च दक्षता - 2

धातुमा 1-3 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छन् र तिनले इलेक्ट्रोन दिन्छन् भने अधातुमा 5-7 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छन् र तिनले इलेक्ट्रोन लिन्छन्। यसरी धातु र अधातुका गुण उल्टा हुन्छन्। पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वलाई पारमाणविक सङ्ख्याको क्रममा राखिने भएकाले हरेक पिरियडमा बायाँबाट दायाँ जाँदा संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यसैले इलेक्ट्रोन दिने तत्त्व (धातु) बायाँ र बिचमा पर्छन् भने इलेक्ट्रोन लिने तत्त्व (अधातु) दायाँ पर्छन्।

अङ्क विभाजन

- ✓ धातुमा 1-3 संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन हुन्छन् र तिनले इलेक्ट्रोन दिन्छन्; अधातुमा 5-7 हुन्छन् र तिनले इलेक्ट्रोन लिन्छन्, त्यसैले गुण उल्टा हुन्छन् भनी लेखेमा।
- ✓ पारमाणविक सङ्ख्याको क्रममा हरेक पिरियडमा बायाँबाट दायाँ संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन बढ्दै जाने भएकाले धातु बायाँ र बिचमा तथा अधातु दायाँ पर्छन् भनी लेखेमा।

9 क्रियाकलाप: हरेक तत्त्वको स्थान खोजौं

(अङ्क नदिइने)

विद्यार्थीले पाउनुपर्ने नतिजा

2, 1 लिथियम: ग्रुप 1, पिरियड 2, धातु। 2, 6 अक्सिजन: ग्रुप 16, पिरियड 2, अधातु। 2, 8, 2 म्याग्नेसियम: ग्रुप 2, पिरियड 3, धातु। 2, 8, 7 क्लोरिन: ग्रुप 17, पिरियड 3, अधातु। 2, 8, 8 आर्गन: ग्रुप 18, पिरियड 3, निष्क्रिय ग्याँस। 2, 8, 8, 1 पोट्यासियम: ग्रुप 1, पिरियड 4, धातु। सेलको सङ्ख्याले पिरियड बताउँछ; संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोनले ग्रुप बताउँछन् (1 र 2 भए ग्रुप 1 र 2, 3 देखि 8 भए ग्रुप 13 देखि 18)।

Science Playground मा हेर्नुहोस्

यस एकाइसँग मिल्ने, भक्तपुरको Science Playground मा रहेका प्रदर्शनी र बिरुवा। विद्यार्थीसहित भ्रमणको समय science-playground.com/booking मा लिन सकिन्छ।

- The Giant Periodic Table (प्रदर्शनी): 4 मिटर लामो पेरियोडिक तालिकामा आफूलाई मन पर्ने तत्त्वको ग्रुप र पिरियड खोज्नुहोस्।

तहअनुसार अङ्क	ज्ञान	बोध	प्रयोग	उच्च दक्षता	जम्मा
अङ्क	8	16	10	2	36

